


経皮的な筋焼却術を受ける患者さまへ

カテーテルは首とソケイ部の2箇所から穿刺予定です。

	入院日	検査当日		治療翌日
	月 日	治療前	治療後	退院
食事	普通食 	9:00から治療の方 朝食なし（検査後食）	治療が終了後、気分不良などなければ飲水、食事もできますが寝たままの状態での食事摂取のなります。	普通食
		2例目以降で午前治療の方 朝食なし。昼食からあります。		
		午後から治療の方 朝食は1/2量です。 昼食なし（検査後食）		
内服薬	普段飲まれているお薬をお持ち下さい。確認いたしません。	中止薬：再開は からになります。 中止薬以外はいつもの時間に内服してください。		
注射		検査2時間前から点滴があります。 治療開始前に抗生剤の点滴があります。	安静解除まで輸液が続きます。	
安静度	病院内	病院内	検査後6時間は床上安静です。 穿刺した方の足を動かしたり、力を入れないようにしてください。	診察後より病院内
排泄		おしっこの管を入れます。 オムツを装着します。	安静解除後におしっこの管を抜きます。	
清潔	入浴またはシャワー浴	入浴不可です。		シャワー浴
検査			心エコー・心電図	
処置	おへそから太ももまでの毛をカットします。	術衣へ着替えて下さい。 (上半身には何も装着しないで下さい)	穿刺部に止血バンドを装着します。 医師の診察が終わるまで装着します。	
看護	入院・検査のオリエンテーションを行います。 手首、足背の動脈にマジックで印をつけます。	施行医より治療の説明があります。 検査前に安定剤が出ることがあります。 カテ室（1F）までは車椅子でご案内します。	心電図モニターを装着します	
			頻回に脈や血圧を測定します。	
備考	同意書を提出してください。	ご家族は説明予定時間前にはお越しください。 当日来られない場合は事前にお知らせください。		
物品	バスタオル1枚（移動時に使用します）のご準備をお願いします。			